8. Übungsblatt

Abgabe: keine Abgabe

Fragen zu den Aufgaben: Simon Töpfer, Raum 3.317, Tel.: 391-5187, s.toepfer@tu-bs.de

20. Lorentz-Transformation

Zwei Minkowski-Systeme Σ und Σ' sind achsenparallel ausgerichtet, der konstante Geschwindigkeitsvektor $\underline{v}$ der Relativbewegung habe jedoch beliebige Richtung (vgl. Abbildung).

(a) Beweisen Sie die Lorentz-Transformationsformel

$$L_j^{i'} = \begin{pmatrix} \delta_b^a + \beta \frac{u^a}{c} \frac{u_b}{c} & -\frac{u^a}{c} \\ -\frac{u_b}{c} & \frac{u^4}{c} \end{pmatrix}, \quad (1)$$

mit der Vierer-Geschwindigkeit

$$u^i := \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \begin{pmatrix} v^a \\ c \end{pmatrix} \quad (2)$$

und

$$\beta := \left[\sqrt{1 - v^2/c^2} - \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \right] \frac{c^2}{v^2}, \quad (3)$$

sowie der Standard-Notation $a, b = 1, 2, 3; i, j = 1, \dots, 4$.

(b) Verifizieren Sie, dass Gleichung (1) im Spezialfall $\underline{v} = v \underline{e}_1$ in die spezielle Lorentz-Transformationsformel (E-Dynamik-Skript III.90) übergeht.

21. Energie-Impuls-Tensor

Der Energie-Impuls-Tensor einer idealen Flüssigkeit hat im Riemann-Raum die Form

$$T^{ik} = \left(\rho_0 + \frac{P_0}{c^2} \right) u^i u^k + g^{ik} P_0 \quad (4)$$

und die Feldgleichungen unter dem Einfluss einer äußeren Kraftdichte k^i lauten

$$T^{ik}{}_{||k} = k^i \quad , \quad (5)$$

wobei ρ_0 , P_0 , u^i die Ruhmassendichte, den Eigendruck und die Vierer-Geschwindigkeit darstellen.

- Formulieren Sie die beiden Gleichungen im Lokalen Inertialsystem (LIS).
- Machen Sie die beiden Gleichungen im LIS plausibel, indem Sie als nichtrelativistischen Grenzfall die Kontinuitätsgleichung und die Euler-Gleichung extrahieren.
- Zeigen Sie, dass der Energie-Impuls-Tensor im LIS eindeutig ist, wenn von den vertrauten Bedingungen im Ruhsystem ausgegangen wird.

22. Laplace-Operator

- Zeigen Sie, dass der Laplace-Operator eines Tensors nullter Stufe f allgemein durch

$$\partial_{\underline{x}}^2 f = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_{\xi^b} \left(\sqrt{g} g^{ab} \partial_{\xi^a} f \right) \quad (6)$$

dargestellt werden kann, wobei g die Determinante des metrischen Fundamentaltensors g_{ab} bezeichnet. Gehen Sie dazu von

$$\partial_{\underline{x}}^2 f = g^{ab} f_{||a||b} \quad (7)$$

aus.

- Zeigen Sie nun mit Hilfe von Gleichung (6), dass der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten $(\xi^1, \xi^2, \xi^3) = (r, \theta, \varphi)$ durch

$$\partial_{\underline{x}}^2 f = \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r f) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta f) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 f \quad (8)$$

gegeben ist.