



## 10. Übungsblatt

Abgabe: keine Abgabe

---

 Fragen zu den Aufgaben: Simon Töpfer, Raum 3.317, Tel.: 391-5187, s.toepfer@tu-bs.de
 

---

**25. Konstanten der Bewegung**

In einem beliebigen Koordinatensystem ist die Bewegungsgleichung eines Teilchens mit den Koordinaten  $\xi^i$  durch

$$\frac{du^i}{d\tau} = -\Gamma_{jk}^i u^j u^k \quad (1)$$

gegeben, wobei  $u^i = \frac{d\xi^i}{d\tau}$ . Zeigen Sie auf drei verschiedenen Wegen, dass  $u^i u_i$  eine Erhaltungsgröße ist:

- Betrachten Sie  $u^i$  als Vierer-Vektor in einem lokalen Inertialsystem und berechnen Sie explizit das Minkowski-Skalarprodukt  $u^i u_i$ .
- Nutzen Sie den Zusammenhang zwischen Gleichung (1) und dem kovarianten Differential aus und zeigen Sie damit

$$\frac{d}{d\tau} (u^i u_i) = 0.$$

- Zeigen Sie explizit mit Hilfe von Gleichung (1), dass

$$\frac{d}{d\tau} (u^i u_i) = 0$$

in jedem Koordinatensystem erfüllt ist.

**26. Isotrope Koordinaten**

Überführen Sie die Schwarzschild-Metrik von den Standard-Koordinaten  $(r, \vartheta, \varphi, ct)$  in isotrope Koordinaten  $(\rho, \vartheta, \varphi, ct)$  mittels der Transformation

$$r = \left(1 + \frac{r_G}{4\rho}\right)^2 \rho \quad . \quad (2)$$

*Bitte wenden* →

## 27. Exakte Differentialgleichungen

Bestimmen Sie die Lösung  $y(x)$  der Differentialgleichung

$$(xy^2 + xye^x) dx + (2x^2y + xe^x) dy = 0. \quad (3)$$

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- (a) Überprüfen Sie die Differentialgleichung auf Exaktheit.
- (b) Bestimmen Sie gegebenenfalls einen integrierenden Faktor  $\mu(x, y)$ , sodass die Differentialgleichung exakt wird. Machen Sie dazu für  $\mu(x, y)$  einen geeigneten Ansatz.
- (c) Multiplizieren Sie die ursprüngliche Differentialgleichung mit dem integrierenden Faktor und bestimmen Sie ein Potential  $\Phi(x, y)$ .
- (d) Ermitteln Sie nun die Lösung  $y(x)$  aus der Bedingung  $\Phi(x, y) = \text{const.}$

Welche Problematik ergibt sich bei der Bestimmung eines integrierenden Faktors in höheren Dimensionen  $n > 2$ ?