keine Abgabe, Besprechung in der Vorlesung am Do., 09.02.2023, 11:30 Uhr

Übungsblätter gibt es unter <https://lnk.tu-bs.de/joFKnf>.

46. Taylor-Entwicklung (0 Punkte)

Ein Teilchen befindet sich in einem Potential $V(x)$. Es gibt einen Punkt $x_0 \in \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft

$$V(x_0) = -a, \quad V''(x_0) = 2b, \quad (1)$$

wobei a, b positive Zahlen sind.

- (a) Wann liegt ein lokales Minimum an der Stelle x_0 vor?
- (b) Nehmen Sie nun ein lokales Minimum an der Stelle x_0 an und approximieren Sie $V(x)$ in der Nähe von x_0 in eine Taylor-Reihe niedrigster Ordnung. Ihre Approximation soll über eine Konstante hinausgehen und die beiden Zahlen a, b enthalten.
- (c) Bestimmen Sie die Zahlen a, b für den Fall $V(x) = \cos(x)$, $x_0 = \pi$.

47. Integrale (0 Punkte)

Berechnen Sie unter Angabe der Integrationsregeln:

(a)

$$\int \frac{\sin(x)}{-\cos(x) + 4} dx. \quad (2)$$

(b)

$$\int_0^\infty \frac{5z^2 \cdot e^{-z}}{3} dz. \quad (3)$$

(c)

$$\int \frac{1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx \quad (4)$$

48. Satz von Stokes (0 Punkte)

Gegeben sei eine Kreisscheibe $\mathcal{K} = \{[x, y, 0] \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$ sowie das Vektorfeld $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$

$$\vec{F} = \begin{bmatrix} xy^2 \\ x^2y \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

- (a) Verifizieren Sie den Satz von Stokes für $\vec{F}$ und $\mathcal{K}$.
- (b) Lässt sich ein skalares Potential ϕ finden, so dass $\text{grad}(\phi) = \vec{F}$? Falls ja, geben Sie es an. Falls nein, warum nicht?

49. Vektoralgebra (0 Punkte)

Seien $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d} \in \mathbb{R}^3$ Vektoren. Berechnen Sie

$$\langle \vec{a} \times \vec{b} \mid \vec{c} \times (\vec{d} \times \vec{a}) \rangle. \quad (6)$$

50. **Lineare Algebra (0 Punkte)**

Ein lineares Gleichungssystem sei gegeben durch

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 12 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 &= 13 \\ 2x_2 + 5x_3 &= 16 \end{aligned} \tag{7}$$

- (a) Bringen Sie das Gleichungssystem auf die Form $M\vec{x} = \vec{b}$ mit einer Matrix M . Berechnen Sie $\det(M)$ und prüfen Sie, ob das Gleichungssystem eindeutig lösbar ist.
- (b) Berechnen Sie alle M^{-1} mithilfe des Gauß-Jordan-Verfahrens und lösen Sie das Gleichungssystem.
- (c) Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix M .
- (d) Geben Sie die Matrix U an, mit der $D = U^{-1}MU$ diagonal wird. Geben Sie D an.

51. **Fourier-Reihe (0 Punkte)**

Berechnen Sie die Fourier-Reihe der Funktion, die als periodische Fortsetzung der Funktion

$$f(x) = \frac{x^2}{2}, \quad x \in [-2, 2] \tag{8}$$

gegeben ist.

52. **Fourier-Transformation (0 Punkte)**

Geben Sie die Definitionen der Fouriertransformation und der dazugehörigen Rücktransformation an.

Es sei nun eine Funktion f definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{für } -\frac{1}{4} < x < \frac{3}{4} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \tag{9}$$

Skizzieren Sie die Funktion und bestimmen Sie die Fouriertransformierte.

53. **Orthonormale Funktionensysteme (0 Punkte)**

Seien $n, m \in \mathbb{N}_0$, die Legendre-Polynome

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \tag{10}$$

und das Skalarprodukt

$$\langle P_n | P_m \rangle = \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx \tag{11}$$

gegeben.

- (a) Zeigen Sie, dass die ersten drei Legendre-Polynome gegeben sind durch: $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$, $P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$.
- (b) Zeigen Sie, dass diese drei Legendre-Polynome einen bezüglich des obigen Skalarprodukts orthonormalen Satz von Funktionen bilden.
- (c) Entwickeln Sie die Funktion $f(x) = \cos(x)$ nach den ersten drei Legendre-Polynomen.