1. Gegeben sei ein Wellenpaket der Form

$$\Psi(\vec{x}, t) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k \hat{\Psi}(\vec{k}) e^{i(\vec{k}\cdot\vec{x} - \omega_{\vec{k}}t)}. \quad (1)$$

Ferner wird der Erwartungswert einer Größe A bezüglich einer Funktion $\Psi(\vec{x})$ bzw. $\hat{\Psi}(\vec{k})$ definiert über

$$\langle A \rangle_{\Psi} = \frac{\int d^3x \Psi^*(\vec{x}) A(\vec{x}) \Psi(\vec{x})}{\int d^3x \Psi^*(\vec{x}) \Psi(\vec{x})}, \quad \langle A \rangle_{\hat{\Psi}} = \frac{\int d^3k \hat{\Psi}^*(\vec{k}) A(\vec{k}) \hat{\Psi}(\vec{k})}{\int d^3k \hat{\Psi}^*(\vec{k}) \hat{\Psi}(\vec{k})}. \quad (2)$$

(a) Zeigen Sie unter Ausnutzung grundlegender Eigenschaften der Fourier-Transformation für zwei Wellenpakete Ψ_1, Ψ_2 mit gleicher Dispersion $\omega_{\vec{k}}$:

$$\int d^3x \Psi_1^*(\vec{x}, t) \Psi_2(\vec{x}, t) = \int d^3k \hat{\Psi}_1^*(\vec{k}) \hat{\Psi}_2(\vec{k}) \quad !$$

(b) Zeigen Sie, daß für die Gruppengeschwindigkeit gilt:

$$\vec{v}_G := \frac{d}{dt} \langle \vec{x} \rangle_{\Psi} = \langle \vec{\nabla}_{\vec{k}} \omega_{\vec{k}} \rangle_{\hat{\Psi}} \quad !$$

(c) Berechnen Sie $\vec{v}_G$ so explizit wie möglich in den folgenden beiden Fällen:

i. $\omega_{\vec{k}} = \frac{\hbar}{2m} \vec{k}^2,$

ii. $\hat{\Psi}(\vec{k})$ ist „konzentriert“ um $\vec{k}_0$, so daß man wie folgt entwickeln kann:

$$\omega_{\vec{k}} \approx \omega_0 + \vec{v}_0 \cdot (\vec{k} - \vec{k}_0) \quad !$$

6 Punkte

2. Gegeben sei zur Zeit $t = 0$ das *eindimensionale* Wellenpaket

$$\Psi(x, 0) = N_{\alpha} e^{-\frac{x^2}{2\alpha^2} + ik_0x}$$

mit $\alpha > 0$.

(a) Bestimmen Sie N_{α} , so daß

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi^*(x, 0) \Psi(x, 0) = 1 \quad !$$

(b) Bestimmen Sie mit Hilfe der eindimensionalen Variante von (1) die zeitliche Entwicklung ($t > 0$) des Wellenpakets für

$$\omega_k = \frac{\beta}{2} k^2$$

und $\beta > 0$!

- (c) Berechnen Sie für das gegebene Wellenpaket die über (2) definierten Erwartungswerte $\langle x \rangle_t$, $\langle x^2 \rangle_t$ und daraus die Standardabweichung

$$\Delta x_t = \sqrt{\langle x^2 \rangle_t - \langle x \rangle_t^2} \quad !$$

Hinweis: Integrale dürfen Tabellenwerken entnommen werden.

6 Punkte

3. **Zusatzaufgabe** (Bearbeitung freiwillig)

Um 1900 gab es für die Dichte $\rho(\omega, T)$ der Strahlung mit Frequenz ω eines schwarzen Körpers mit Temperatur T verschiedene Formeln. Das Gesetz von *Rayleigh-Jeans*

$$\rho(\omega, T) = \frac{\omega^2 kT}{\pi^2 c^3}$$

basiert auf klassischen Betrachtungen und funktioniert gut bei hohen Temperaturen ($\hbar\omega \ll kT$). *Max Planck* gab mit seiner Strahlungsformel einen wichtigen Anstoß für die Entwicklung der Quantenmechanik. Dies wird in der *Einsteinschen* Theorie der Übergänge evident.

Wir betrachten hier zwei Zustände E_m, E_n eines Systems mit diskreten Energieniveaus, wobei wir $E_m > E_n$ annehmen. Das System kann von dem höheren Zustand in den niedrigeren übergehen, in dem es einen Lichtquant $\hbar\omega = E_m - E_n$ emittiert. Die Wahrscheinlichkeit einer *spontanen* Emission eines solchen Quants pro Zeit bezeichnen wir mit

$$dW'_e = a_m^n dt.$$

Ein äußeres Strahlungsfeld der Dichte $\rho(\omega, T)$ kann zudem Übergänge $m \rightarrow n$ induzieren. Bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit der induzierten Emission mit dW''_e , so ist die Gesamtwahrscheinlichkeit der Emission

$$dW_e = dW'_e + dW''_e.$$

Schließlich kann ein Lichtquant mit Wahrscheinlichkeit dW_a bei einem Übergang $n \rightarrow m$ absorbiert werden.

Einstein nahm nun an, daß die Übergangsraten für die durch das Strahlungsfeld induzierten Übergänge proportional zur Strahlungsdichte sind, d.h.

$$dW_a = b_n^m \rho(\omega, T) dt, \quad dW''_e = b_m^n \rho(\omega, T) dt.$$

- (a) Sei n_j die Anzahl der besetzten Zustände E_j zum Zeitpunkt t . Stellen Sie die Bedingung für Stationarität auf, d.h. dafür daß sich diese Besetzungszahlen durch die Wechselwirkung mit dem Strahlungsfeld nicht mit der Zeit ändern! Drücken Sie diese Bedingung durch die Größen n_j, a_j^k, b_j^k und $\rho(\omega, T)$ aus!
- (b) Die Besetzungszahlen der Niveaus des Systems sind gegeben durch die *Boltzmann-Verteilung*

$$n_j \propto e^{-\frac{E_j}{kT}}.$$

Setzen Sie dies in die Gleichgewichtsbedingung ein und leiten Sie durch Betrachtung des Grenzfalles $T \rightarrow \infty$ eine Beziehung zwischen den Koeffizienten b_n^m und b_m^n her!

Hinweis: Sie dürfen eingangs genannte Eigenschaften für die Asymptotik von $\rho(\omega, T)$ verwenden.

- (c) Lösen Sie nun die Gleichgewichtsbedingung nach $\rho(\omega, T)$ auf und bestimmen Sie den dabei auftretenden energieabhängigen Koeffizienten durch Vergleich mit dem klassischen Grenzfall $kT \gg \hbar\omega$!

6 Zusatzpunkte