Anwesenheitsübung (keine Abgabe)

A1. Wir betrachten die folgende eindimensionale Stufe

d.h.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0 \\ -U < 0 & \text{für } x > 0 \end{cases} .$$

Lösen Sie die Schrödingergleichung mit dem Ansatz

$$\psi(x, t) = e^{-iEt/\hbar} u(x)$$

für negative Energien ($E < 0$)! Welche Werte kann E annehmen? Skizzieren Sie $|\psi(x, t)|^2$ für $E = -U/2$ und interpretieren Sie das Ergebnis!

Hausaufgaben

H1. Das *Ehrenfestsche* Theorem sagt aus, daß Erwartungswerte die kanonischen Bewegungsgleichungen der klassischen Mechanik erfüllen.

Wir wollen hier eine Form des Ehrenfestschen Theorems für einen eindimensionalen Hamilton-Operator der Form:

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x)$$

mit reellem $V(x)$ verifizieren. Der Erwartungswert einer Größe A ist definiert als

$$\langle A \rangle = \int dx \psi(x, t)^* A \psi(x, t) ,$$

wobei $\psi(x, t)$ eine normierte Lösung ($\int dx \psi(x, t)^* \psi(x, t) = 1$) der Schrödingergleichung ist.

Zeigen Sie:

(a)

$$\frac{d}{dt} \langle p \rangle = - \left\langle \frac{\partial H}{\partial x} \right\rangle ,$$

(b)

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \left\langle \frac{\partial H}{\partial p} \right\rangle \quad !$$

Hinweis: Verwenden Sie, daß p und x nicht explizit von der Zeit abhängen, d.h. $\frac{d}{dt}p = 0 = \frac{d}{dt}x$, die Schrödingergleichung für ψ und ψ^* , sowie partielle Integration.

6 Punkte

H2. Wir betrachten ein Teilchen in dem folgenden eindimensionalen Potentialtopf

d.h.

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } |x| > a \text{ ,} \\ -U < 0 & \text{für } |x| < a \text{ .} \end{cases}$$

- Geben Sie die allgemeine normierbare Lösung der Schrödingergleichung für $E < 0$ an !
- Klassifizieren Sie die Lösungen nach ihrem Verhalten unter Spiegelung am Ursprung $x \rightarrow -x$!
- Leiten Sie aus der Bedingung einer glatten Lösung eine Bedingung an die Energie des Teilchens her !
- Geben Sie ein graphisches Lösungsverfahren der Eigenwertgleichung für die Energie an und bestimmen Sie die Anzahl der Lösungen für $2mUa^2/\hbar^2 = 30$!

8 Punkte

H3. **Zusatzaufgabe** (Bearbeitung freiwillig)

Gegeben sei zu einem festen $\vec{k}$ die ebene Welle

$$\psi(\vec{x}, t) = A e^{i(\vec{k} \cdot \vec{x} - \omega_{\vec{k}} t)} .$$

- Bestimmen Sie $\omega_{\vec{k}}$ so, daß $\psi(\vec{x}, t)$ die Schrödingergleichung für ein freies Teilchen, d.h.

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

löst !

- Berechnen Sie zu $\psi(\vec{x}, t)$ die Wahrscheinlichkeitsstromdichte $\vec{j}$!
- Überzeugen Sie sich, daß die Aufenthaltswahrscheinlichkeit $\rho(\vec{x}, t) = |\psi(\vec{x}, t)|^2$ zusammen mit $\vec{j}$ aus Aufgabenteil (b) die Kontinuitätsgleichung erfüllt !

4 Zusatzpunkte