H1. Der Hamilton-Operator des eindimensionalen harmonischen Oszillators ist gegeben durch:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{r}^2. \quad (1)$$

In der Vorlesung wurde gezeigt, wie das Spektrum mittels der Auf- und Absteigeoperatoren

$$\hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{r} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p}, \quad \hat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{r} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p}$$

bestimmt werden kann. Hier wollen wir eine Ortsdarstellung der Eigenvektoren $|n\rangle$ ($\hat{H}|n\rangle = \hbar\omega(n + 1/2)|n\rangle$) bestimmen.

- (a) Setzen Sie die Ortsdarstellung von $\hat{p}$ in die Operatoren $\hat{a}$ und $\hat{a}^\dagger$ ein und drücken Sie diese durch die dimensionslose Größe

$$q = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} r$$

aus !

Hinweis: Verwenden Sie im folgenden immer die dimensionslose Größe q (soweit möglich) !

- (b) Interpretieren Sie die Bedingung

$$\hat{a}|0\rangle = 0$$

als Differentialgleichung für die Grundzustandswellenfunktion $\psi_0(q) = \langle q|0\rangle$ und bestimmen Sie die *normierte* ($\int_{-\infty}^{\infty} dr |\psi_0(r)|^2 = 1$) Lösung $\psi_0(q)$!

- (c) Zeigen Sie durch wiederholte Anwendung von $\hat{a}^\dagger$ auf $\psi_0(q)$, daß $\psi_n(q) \propto (\hat{a}^\dagger)^n \psi_0(q)$ die Form

$$\psi_n(q) = C_n e^{-q^2/2} H_n(q)$$

hat. Hierbei ist $H_n(q)$ das *n*te *Hermite*-Polynom

$$H_n(q) = e^{q^2/2} \left(q - \frac{d}{dq} \right)^n e^{-q^2/2}. \quad (2)$$

Bestimmen Sie die Normierungskonstante C_n !

- (d) Leiten Sie aus den Relationen $\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$, $\hat{a}^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ eine Rekursionsrelation für $H_n(q)$ her ! Bestimmen Sie daraus H_n mit $n = 1, 2, 3, 4$!

Wieviele Nullstellen hat $H_n(q)$ (Knotensatz) ?

Hinweis: H_0 ist explizit aus der Definition (2) zu bestimmen. H_1 erhält man aus H_0 , da hier in der Rekursionsrelation H_{-1} mit Koeffizient 0 auftritt.

(e) Skizzieren Sie

$$\frac{\psi_n(q)}{\sqrt[4]{\frac{m\omega}{\hbar}}}$$

für $n = 0, 1, 2$ und 3 !

8 Punkte

H2. Wir wollen nun einen alternativen Zugang zum eindimensionalen harmonischen Oszillator entwickeln.

(a) Bringen Sie die stationäre Schrödingergleichung zu dem Hamilton-Operator (1) in die Form

$$\frac{\hbar\omega}{2} \left(-\frac{d^2}{dq^2} + q^2 \right) \psi_n(q) = E_n \psi_n(q) \quad ! \quad (3)$$

(b) Geben Sie eine *normierbare* Lösung der Differentialgleichung

$$\left(-\frac{d^2}{dq^2} + q^2 - 1 \right) f(q) = \left(-\frac{d}{dq} + q \right) \left(+\frac{d}{dq} + q \right) f(q) = 0$$

an !

Bemerkung: Hierbei erhalten Sie einen Hinweis auf die Asymptotik von $\psi_n(q)$ für große q .

(c) Das Ergebnis aus Aufgabenteil (b) motiviert folgenden Lösungsansatz:

$$\psi_n(q) = e^{-q^2/2} \sum_{l=0}^{\infty} \alpha_l q^l.$$

Setzen Sie diesen Ansatz in die Differentialgleichung (3) ein und zeigen Sie durch Vergleich der Koeffizienten gleicher q -Potenzen, daß die α_l folgende Rekursionsrelation erfüllen:

$$(l+2)(l+1) \alpha_{l+2} = \left((2l+1) - \frac{2E_n}{\hbar\omega} \right) \alpha_l \quad ! \quad (4)$$

(d) Begründen Sie, warum aus der Normierbarkeit der Wellenfunktion $\psi_n(q)$ eine Abbruchbedingung $\alpha_l = 0$ für $l > l_0$ folgt ! Leiten Sie aus dieser Abbruchbedingung einen Ausdruck für die Energie-Eigenwerte E_n her !

(e) Lösen Sie die Rekursionsrelation (4) für die α_l mit der Abbruchbedingung aus Aufgabenteil (d) für den Grundzustand $n = 0$! Geben Sie schließlich die explizite Form der *normierten* Wellenfunktion $\psi_0(r)$ an !

8 Punkte

H3. **Zusatzaufgabe** (Bearbeitung freiwillig)

Wie Sie wissen, kann man sich z.B. anhand der Ortsdarstellung in einer konkreten Basis davon überzeugen, daß in drei Dimensionen die *Heisenbergschen* Vertauschungsrelationen lauten:

$$[\hat{p}_j, \hat{x}_k] = \frac{\hbar}{i} \delta_{j,k} \mathbb{1}. \quad (5)$$

Sei $\hat{p}' = V U^\dagger \hat{p} U$, $\hat{x}' = V U^\dagger \hat{x} U$ mit V einer orthogonalen Abbildung in $\mathbb{R}^3$ und U einer unitären Abbildung im Hilbertraum. Zeigen Sie: Die Komponenten von $\hat{p}'$ und $\hat{x}'$ erfüllen ebenfalls die Heisenbergschen Vertauschungsrelationen (5) !

Bemerkung: Da Wechsel zwischen orthonormalen Basen durch orthogonale Matrizen V vermittelt werden, folgt daraus insbesondere, daß (5) in einer beliebigen orthonormalen Basis gilt.

3 Zusatzpunkte