1. Wissensfragen

(24 Punkte)

Benennen Sie alle auftretenden Symbole.

- (a) Geben Sie die Definition der Wahrscheinlichkeitsstromdichte $\underline{j}$ an.
Welche Gleichung verknüpft $\underline{j}$ mit $|\Psi|^2$? (Formel!)
Wie ist diese Gleichung physikalisch zu interpretieren?
- (b) Was *besagt* die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation? (kurze Erläuterung!)
- (c) Durch welchen Ansatz für $\psi(\underline{x}, t)$ gelangt man von der zeitabhängigen zur stationären Schrödinger-Gleichung?
- (d) Wie lauten die Energien U_n der gebundenen Zustände des Wasserstoffatoms? Geben Sie auch den Entartungsgrad der U_n an.
- (e) Wie hängen die Kugelflächenfunktionen $Y_l^m(\theta, \phi)$ vom Winkel ϕ ab?
- (f) Wie wirken die Operatoren $\hat{L}_3$ und $\hat{L}^2$ auf die Kugelflächenfunktionen Y_l^m ?
- (g) Wir betrachten eine Observable F . Welche Eigenschaften haben der zugehörige Operator $\hat{F}$ und das Eigenwertproblem von $\hat{F}$?
- (h) Geben Sie die Definition von Auf- und Absteigeoperator sowie die zugehörigen Eigenwertgleichungen an.
- (i) Wie lautet die Bewegungsgleichung für einen Operator $\hat{A}$ (i) im Schrödinger-Bild, (ii) im Heisenberg-Bild, (iii) im Dirac-Bild?
- (j) Skizzieren Sie Idee und Vorgehen bei der stationären Störungstheorie nach Rayleigh-Schrödinger.

2. Eigenfunktionen des Bahndrehimpulses

(9 Punkte)

Wir betrachten den Ortsoperator $\hat{\underline{x}} = (\hat{x}_1, \hat{x}_2, \hat{x}_3)$, den Impulsoperator $\hat{\underline{p}} = (\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3)$ sowie den Drehimpulsoperator $\hat{\underline{L}} = (\hat{L}_1, \hat{L}_2, \hat{L}_3)$.

- (a) Wir definieren die Operatoren

$$\hat{L}_+ = \hat{L}_1 + i\hat{L}_2 \quad \text{und} \quad \hat{L}_- = \hat{L}_1 - i\hat{L}_2 \quad . \quad (1)$$

Zeigen Sie:

$$\hat{L}^2 = \hat{L}_+ \hat{L}_- - \hbar \hat{L}_3 + (\hat{L}_3)^2 \quad . \quad (2)$$

- (b) Wir betrachten die folgende Funktion des Ortes $\underline{r} = (x_1, x_2, x_3)$:

$$\psi(\underline{r}) = (x_1 - ix_2)^3 f(|\underline{r}|) \quad . \quad (3)$$

Mit f wird eine beliebige (hinreichend oft differenzierbare) Funktion bezeichnet.

- i. Zeigen Sie, dass $\psi(\underline{r})$ eine Eigenfunktion von $\hat{L}_3$ ist. Wie lautet der zugehörige Eigenwert?
- ii. Wie wirkt der Operator $\hat{L}_+\hat{L}_-$ auf $\psi(\underline{r})$?
- iii. Zeigen Sie damit und unter Verwendung des Ergebnisses von Teilaufgabe (b): $\psi(\underline{r})$ ist auch Eigenfunktion von $\hat{L}^2$. Wie lautet der zugehörige Eigenwert?
- iv. Geben Sie die zu der angegebenen Funktion $\psi(\underline{r})$ gehörenden Quantenzahlen l und m an.

3. Abstrakte Formulierung

(9 Punkte)

Die Vektoren $|e_1\rangle$, $|e_2\rangle$ und $|e_3\rangle$ mögen eine Orthonormalbasis des dreidimensionalen Hilbert-Raumes $\mathcal{H}$ bilden. Wir betrachten die Vektoren

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}|e_1\rangle - \frac{i}{2}|e_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|e_3\rangle \quad \text{und} \quad |\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|e_1\rangle + \frac{i}{\sqrt{3}}|e_2\rangle \quad . \quad (4)$$

Zudem bezeichnen wir mit $\hat{\mathcal{P}}_\psi$ und $\hat{\mathcal{P}}_\chi$ die Projektionsoperatoren auf die von $|\psi\rangle$ bzw. $|\chi\rangle$ aufgespannten eindimensionalen Unterräume von $\mathcal{H}$.

- (a) Sind $|\psi\rangle$ und $|\chi\rangle$ normiert?
- (b) Bestimmen Sie die Matrixdarstellungen der Projektionsoperatoren $\hat{\mathcal{P}}_\psi$ und $\hat{\mathcal{P}}_\chi$ bezüglich der Basis $\{|e_1\rangle, |e_2\rangle, |e_3\rangle\}$.
Hinweis: Beachten Sie das Ergebnis von Teilaufgabe (a)!
- (c) Ist der Operator $\hat{A} = \hat{I} - \hat{\mathcal{P}}_\psi - \hat{\mathcal{P}}_\chi$ ein Projektionsoperator? Begründen Sie Ihre Antwort.
- (d) Zeigen Sie allgemein, dass unitäre Operatoren Eigenwerte vom Betrag eins haben.

4. Streuung an einer Potentialbarriere

(8 Punkte)

Im Abstand $a > 0$ zu einer unendlich hohen Potentialwand befindet sich ein Delta-Peak. Das Potential lautet also:

$$V(x) = V_1(x) + V_2(x) \quad (5)$$

mit

$$V_1(x) = \begin{cases} \infty & \text{für } x < 0 \\ 0 & \text{für } x > 0 \end{cases} \quad \text{und} \quad V_2(x) = W_0 \delta(x - a) \quad . \quad (6)$$

Der Parameter W_0 ist positiv. Ziel dieser Aufgabe ist das Lösen der stationären Schrödinger-Gleichung für positive Energien $U > 0$.

- (a) Zeigen Sie, dass die erste Ableitung der Wellenfunktion $\phi(x)$ bei $x = a$ die Anschlussbedingung

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \phi'(\epsilon + a) - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \phi'(-\epsilon + a) - \frac{2mW_0}{\hbar^2} \phi(a) = 0 \quad (7)$$

erfüllen muss.

- (b) Bestimmen Sie die Lösung der zeitfreien Schrödinger-Gleichung für alle $x \in \mathbb{R}$. Verwenden Sie im Bereich $x > a$ einen Ansatz, der eine Überlagerung aus einer von rechts einlaufenden und einer reflektierten Welle darstellt: $\phi(x) = \exp(-ikx) + R \exp(ikx)$ für $x > a$. Wie lauten die Parameter k und R ?

5. Potentialtopf mit Delta-Peak

(10 Punkte)

Ein Teilchen der Masse m ist in einen unendlich hohen Potentialkasten eingesperrt, dessen Wände sich bei $x = 0$ und $x = L$ befinden. Zusätzlich befindet sich in der Mitte des Potentialkastens (bei $x = L/2$) ein Delta-Peak. Das Potential lautet also

$$V(x) = V_1(x) + V_2(x) \quad (8)$$

mit

$$V_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } 0 < x < L \\ \infty & \text{für } x < 0 \text{ oder } x > L \end{cases} \quad \text{und} \quad V_2(x) = W_0 \delta\left(x - \frac{L}{2}\right) \quad (9)$$

Die Konstante W_0 ist positiv. Wir betrachten wieder den Bereich $U > 0$.

(a) Zeigen Sie: Die Energieniveaus U dieses Systems genügen der Gleichung

$$\tan \frac{kL}{2} = -\frac{\hbar^2 k}{mW_0} \quad \text{mit} \quad k = \sqrt{\frac{2mU}{\hbar^2}} \quad (10)$$

(b) Es sei U_0 der kleinste (positive) Energiewert des Systems und $k_0 = \sqrt{\frac{2mU_0}{\hbar^2}}$. Begründen Sie anhand einer graphischen Lösung von Gl. (10):

$$\frac{\pi}{2} < \frac{k_0 L}{2} < \pi \quad (11)$$

6. Eindimensionaler harmonischer Oszillator

(12 Punkte)

Alle Teilaufgaben können voneinander unabhängig bearbeitet werden.

(a) Betrachten Sie den Grundzustand des Oszillators ($n = 0$). Zeigen Sie, dass die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen außerhalb des klassisch erlaubten Bereichs anzutreffen, durch

$$P = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_1^\infty dt e^{-t^2} \quad (12)$$

gegeben ist. Der Zahlenwert dieses Integrals kann in Tabellenwerken nachgeschlagen werden und liegt bei $P \approx 16\%$. Erklären Sie zunächst, was der *klassisch erlaubte Bereich* ist.

(b) Zur Zeit $t = 0$ sei die Wellenfunktion des Oszillators durch

$$\Psi(x, t = 0) = A \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \phi_n(x) \quad (13)$$

gegeben.

- i. Bestimmen Sie die (reelle) Normierungskonstante A .
- ii. Zeigen Sie, dass $|\Psi(x, t)|^2$ eine Überlagerung zeitlich periodischer Funktionen ist und bestimmen Sie die längste auftretende Periode.
- iii. Bestimmen Sie den Erwartungswert der Energie.

Hinweis: Die Eigenfunktionen des harmonischen Oszillators sind durch

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} e^{-\xi^2/2} (-1)^n e^{\xi^2} d_{\xi}^n e^{-\xi^2} \quad , \quad \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \quad (14)$$

gegeben.

Die Klausur findet am Do., 17. Februar 2011 um 9.30 Uhr in MS 3.1 statt.