8. Übungsblatt

Abgabe: 18. Mai 2017 bis 9.40 Uhr im Kasten vor 3.317

Fragen zu den Aufgaben: Moritz Feyerabend, Raum 3.317, Tel.: 391-5187, m.feyerabend@tu-bs.de

14. Virialsatz

(7 Punkte)

Verifizieren Sie für das Zweikörperproblem der Himmelsmechanik den Virialsatz

$$U = \frac{\langle V \rangle}{2} \quad \text{mit} \quad \langle V \rangle = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau V dt \quad .$$

τ beschreibt hierbei die Umlaufzeit. Betrachten Sie hierfür die äquivalente Einkörperbeschreibung im Schwerpunktsystem. Greifen Sie dazu auf aus der Vorlesung bekannte Ergebnisse zurück.

Hinweise: Beachten Sie zunächst $\frac{1}{\tau} \int_0^\tau V(t) dt = \frac{1}{\tau} \int_0^{2\pi} V(\varphi) \frac{dt}{d\varphi} d\varphi$. Weiterhin hilfreich sind im Skript S.85 (oben), sowie Gleichung II.186. Außerdem ist

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{1+\epsilon \cos x} dx = \frac{2\pi}{\sqrt{1-\epsilon^2}} \quad \text{für} \quad 0 < \epsilon \leq 1.$$

15. Nebenbedingungen

(5 Punkte)

Geben Sie die Art der Nebenbedingungen sowie die Formeln für die folgenden Systeme an:

- (a) eine kleine Kugel (Radius vernachlässigbar), die auf einer großen, festen Kugel hinunterrollt und sich auch von dieser ablösen kann.
- (b) ein Teilchen, das auf der Innenfläche eines Rotationsparaboloids hinuntergleitet.
- (c) ein Massenpunkt, der sich auf einer zeitlich veränderlichen Ebene bewegt. Zur Zeit $t = 0$ sei die Ebene in Normalenform mit dem Stützvektor $\underline{p}$ und dem Normalenvektor $\underline{n}$ gegeben, wobei $\underline{p}$ zeitlich konstant und $\underline{n} = \underline{n}(t)$ zeitlich veränderlich ist. Die Ebene drehe sich um die Achse $\underline{d} = \frac{\underline{p} \times \underline{n}(t=0)}{|\underline{p} \times \underline{n}(t=0)|}$. Der Stützvektor $\underline{p}$ zeigt hierbei auf die Drehachse. Bestimmen Sie die Formel für die Nebenbedingung in Abhängigkeit vom Winkel zwischen $\underline{n}(t = 0)$ und $\underline{n}(t)$.

Hinweis zu (a): Im Falle des AblöSENS geht die Gleichung für die Nebenbedingung in eine Ungleichung über.

16. D'Alembert und Gleichgewicht

(8 Punkte)

Zwei Massenpunkte mit den Massen m_1 und m_2 sind wie in obiger Skizze über einen masselosen, reibungsfreien Faden miteinander verbunden und der Wirkung der Schwerkraft ausgesetzt.

- (a) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen für die beiden Massen mit Hilfe des d'Alembertschen Prinzips auf. Führen Sie dazu zunächst ein geeignetes Koordinatensystem ein.
- (b) Geben Sie die Gleichgewichtsbedingung und deren Interpretation an.