25. **Elektromagnetisches Feld einer bewegten Punktladung**

In dieser Aufgabe soll das Feld einer mit konstanter Geschwindigkeit bewegten Punktladung berechnet werden.

- (a) Bestimmen Sie das Vierer-Potenzial A^μ der Punktladung in ihrem Ruhesystem Σ' . Geben Sie das Vierer-Potenzial aus Sicht eines relativ zu Σ' mit $\vec{v} = v_0 \vec{e}_1$ bewegten Inertialsystems Σ an. Welche Felder $\vec{E}$ und $\vec{B}$ beobachtet man in Σ ? Bestimmen Sie die Äquipotenzialflächen $\Phi(\vec{r}) = \text{const}$ und skizzieren Sie diese sowie die Feldlinien von $\vec{E}$.
- (b) Aus der Vorlesung sind die Liénard-Wiechert Potenziale bekannt. Berechnen Sie $\vec{E}$ und $\vec{B}$ für den Fall einer Punktladung, die sich mit konstantem $\vec{v} = v_0 \vec{e}_1$ bewegt. Leiten Sie dazu die folgende Form der Liénard-Wiechert Potenziale ab:

$$A_i(\vec{r}, t) = \frac{q}{c} \frac{v_i(\tau)}{[|\vec{r} - \vec{x}(\tau)| - (1/c)\vec{v}(\tau) \cdot (\vec{r} - \vec{x}(\tau))]} \Big|_{\tau=t_{\text{ret}}}$$

$$\Phi(\vec{r}, t) = \frac{q}{[|\vec{r} - \vec{x}(\tau)| - (1/c)\vec{v}(\tau) \cdot (\vec{r} - \vec{x}(\tau))]} \Big|_{\tau=t_{\text{ret}}} \quad (1)$$

$\vec{x}(t)$ ist die Bahnkurve der Punktladung und $\vec{v}(t)$ ihre Geschwindigkeit. Beachten Sie beim Differenzieren, dass die Gleichung $t_{\text{ret}} = t - |\vec{r} - \vec{x}(t_{\text{ret}})|/c$ eine *implizite* Definition der retardierten Zeit darstellt. Formen Sie $\vec{E}$ solange um, bis Sie für $\vec{E}$ Ihr Ergebnis aus Teil (a) erhalten (und zwar dasjenige für $\vec{E}$ aus (a)!).

Hinweis: Es ist hilfreich, die Abkürzungen

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{x}(t_{\text{ret}}); \quad R = |\vec{R}|; \quad v_R = \frac{\vec{v}(t_{\text{ret}}) \cdot \vec{R}}{R}$$

einzuführen und zunächst die Ausdrücke $\partial t_{\text{ret}}/\partial t$; ∇t_{ret} ; ∇R ; ∇v_R usw. zu bestimmen, *ohne* dabei die retardierte Zeit zu eliminieren. Stellen Sie also zunächst $\vec{E}$ und $\vec{B}$ in Abhängigkeit von $\vec{R}$ und v_R dar. Um mit (a) vergleichen zu können, muss die retardierte Zeit aus $\vec{E}$ eliminiert werden. Zeigen Sie dazu:

$$\vec{r} - \vec{v}t = \vec{R} - R \frac{\vec{v}}{c} \quad \text{und} \quad R^2(1 - v_R/c)^2 = (\vec{r} - \vec{v}t)^2 - [(\vec{v}/c) \times (\vec{r} - \vec{v}t)]^2.$$

Bitten wenden! →

26. Multipolentwicklung

Berechnen Sie das Monopol-, Dipol- und Quadrupolmoment der folgenden Ladungsverteilungen bezüglich des Koordinatenursprungs:

- Vier Punktladungen q und $-q$ wie rechts in der Skizze dargestellt.
- Homogen geladene Kugelschale mit Radius R , deren Mittelpunkt im Ursprung liegt.
- Zylinder mit Radius R und Länge L , sowie mit folgender Raumladungsdichte:
 $\rho(\vec{r}) = \{c x_3^n; \quad c = \text{const}, n \in \mathbb{N} \text{ für } -L/2 \leq x_3 \leq L/2$
und $x_1^2 + x_2^2 \leq R^2\}$

Geben Sie außerdem jeweils die Beiträge der einzelnen Momente zum Potenzial $\Phi(\vec{r})$ an.

27. Quadrupolmoment

- Zeigen Sie, dass das Quadrupolmoment ein Tensor 2. Stufe ist.
- Wann ist das Quadrupolmoment unabhängig von der Wahl des Koordinatenursprungs? Beweisen Sie Ihre Aussage.
- Überlegen Sie sich, unter welchen Voraussetzungen man das Quadrupolmoment Q_{ij} eines starren Körpers durch seinen Trägheitstensor Θ_{ij} ausdrücken kann. Geben Sie den Zusammenhang zwischen den Komponenten des Quadrupolmoments und denen des Trägheitstensors an.